

## RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

### 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Suppositoires à la glycérine LAMBO adultes 3,7 g  
Suppositoires à la glycérine LAMBO enfants 2 g  
Suppositoires à la glycérine LAMBO nourrissons 1 g

### 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Suppositoires à la glycérine LAMBO adultes 3,7 g : glycérol 65 %  
Suppositoires à la glycérine LAMBO enfants 2 g : glycérol 65 %  
Suppositoires à la glycérine LAMBO nourrissons 1 g : glycérol 65 %

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

### 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Suppositoire

### 4. DONNÉES CLINIQUES

#### 4.1 Indications thérapeutiques

Traitement symptomatique de la constipation occasionnelle dont la source se situe au niveau du sigmoïde et du rectum.

#### 4.2 Posologie et mode d'administration

1 à 2 suppositoires par jour. L'utilisation prolongée de laxatifs doit être évitée. Il faut essayer de surmonter la constipation chronique en adaptant le régime alimentaire et en modifiant le mode de vie.  
L'insertion des suppositoires est facilitée si vous les mouillez.

#### 4.3 Contre-indications

Hypersensibilité au glycérol ou à la gélatine

Ne pas administrer en cas d'obstruction intestinale, de douleurs abdominales sans cause connue, de nausées et de vomissements, de maladies inflammatoires du côlon (rectocolite) ou de fissure anale.

Pas chez les patients présentant des symptômes de déshydratation.

#### 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Il est souhaitable d'éviter d'instaurer un traitement prolongé par laxatifs, qui place le patient dans une position où il ne peut plus se passer du médicament. La prudence est recommandée chez les patients âgés.

Étant donné la métabolisation du glycérol en glycogène, il faut surveiller le taux de glucose chez les patients diabétiques.

#### 4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Les diurétiques peuvent aggraver les troubles hydro-électrolytiques.

#### 4.6 Fécondité, grossesse et allaitement

Aucun problème n'a été rapporté dans l'utilisation de suppositoires au glycérol pendant la grossesse et l'allaitement.

#### 4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Le glycérol n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

#### **4.8 Effets indésirables**

Une irritation rectale ou des sensations de brûlure peuvent se manifester, mais rarement.  
Après administration rectale du glycérol, une hyperglycémie éventuelle pourrait apparaître, mais ceci n'est pas encore décrit dans la dose thérapeutique.

#### **4.9 Surdosage**

Il n'y a aucun risque connu de surdosage par l'administration rectale de glycérol. En cas d'ingestion orale accidentelle d'une grande quantité de suppositoires à la glycérine, par exemple par un enfant, des nausées, des maux de tête, une sensation de soif et une irritation des muqueuses pourraient apparaître.  
Dans certains cas, une hyperglycémie pourrait se manifester.  
Ajout de liquide (oral ou solution hypotonique de NaCl) et suppression de l'hyperglycémie par l'administration d'insuline.

### **5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES**

Classe pharmacothérapeutique : Laxatif, Code ATC : A06AX01

#### **5.1 Propriétés pharmacodynamiques**

Le glycérol appartient au groupe des laxatifs à effet osmotique sur les intestins. Dans l'intestin, il attire l'eau et ramollit les selles. L'hyper-osmose entraîne un péristaltisme accentué dans le côlon dans les 30 minutes.

#### **5.2 Propriétés pharmacocinétiques**

Après administration rectale, le glycérol est mal résorbé.

#### **5.3 Données de sécurité préclinique**

Sans objet.

### **6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES**

#### **6.1 Liste des excipients**

Gélatine 13 %  
Eau purifiée 22 %

#### **6.2 Incompatibilités**

Sans objet.

#### **6.3 Durée de conservation**

5 ans

#### **6.4 Précautions particulières de conservation**

Conserver à moins de 25 °C  
Une demi-heure avant l'administration, placer le suppositoire à température ambiante.

#### **6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur**

Suppositoires à la glycérine LAMBO adultes 3,7 g : suppositoires à la glycérine 10 et 100 pièces  
Suppositoires à la glycérine LAMBO enfants 2 g : suppositoires à la glycérine 10 pièces  
Suppositoires à la glycérine LAMBO nourrissons 1 g : suppositoires à la glycérine 10 pièces

#### **6.6 Précautions particulières d'élimination et manipulation**

Pas d'exigences particulières.

## **7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Laboratoires LAMBO N.V.  
Simon de Heuvellaan 4  
B-2110 Wijnegem  
Belgique  
Tel.: 03 236 23 64  
Fax: 03 235 12 93  
E-mail: info@labo-lambo.be

## **8. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE 193645 (Adultes 10 pièces)  
BE207952 (Adultes 100 pièces)  
BE193636 (Enfants 10 pièces)  
BE193627 (Nourrissons 10 pièces)

## **9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION**

- A. Date de la première autorisation : 18/05/1998
- B. Date du renouvellement de l'autorisation : 19/04/2004

## **10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE**

Février 2013

Date d'approbation : 01/2018